

ANGINA

Streptokokna angina je najpogostejša v starostnem obdobju med 5 in 15 let.

Povzročitelj se prenaša z bolnika na zdravega človeka s kapljicami sline ali nosnega izcedka. Širi se zlasti tam, kjer ljudje živijo v tesnem stiku, na primer v vrtcih in šolah.

Angina se v zmernem zemljepisnem pasu pojavlja v hladnih mesecih, v področju tropov pa v deževni dobi.

Angina se začne nenadno s povišano temperaturo in bolečinami v žrelu pri požiranju. Bolečine so lahko tako močne, da je moteno požiranje sline. Večji otroci pogosto tožijo zaradi glavobola, mlajši pa pogosteje tožijo, da jih boli trebušček, neredko tudi bruhamo.

Jezik je v začetku bolezni ponavadi obložen, kasneje pa se lušči in zaradi povečanja brbončic dobi malinast videz. Običajno so močno povečane in boleče področne bezgavke.

Od okužbe do začetka bolezni preteče 2 do 5 dni. Bolezen traja nekaj dni. Pri otrocih mlajših od 3 let se lahko pojavi še izcedek iz nosu in povečanimi bezgavkami. Ti otroci prebolevajo okužbo tudi brez vročine.

Zdravilo za zdravljenje streptokokne angine je z antibiotiki v obliki tablet ali sirupa. Zdravljenje mora trajati 10 dni. 24 ur po začetku antibiotičnega zdravljenja bolnik ni več kužen za okolico.

Organizator ZHR in prehrane

Meta Sebal, san. ing.



Mestna občina
Ljubljana

